

eUnisalessianoS@úde

Revista Eletrônica do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium - Araçatuba (São Paulo)

ISSN 2526-1215



ANAIS da 5ª Conferência de Medicina do UniSALESIANO



2023 - Edição Especial

eUnisalesianoS@úde

Revista do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium - Araçatuba (São Paulo)

ISSN 2526-1215

ANAIS da 5ª Conferência de Medicina do UniSALESIANO

2023 - Edição Especial

eUnisalesianoS@úde

Revista do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium - Araçatuba (São Paulo)

ISSN 2526-1215

Corpo Editorial

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium - UniSALESIANO de Araçatuba

Conselho Diretivo

Pe. Erondi Tamandaré Reis Pereira

Presidente

Prof. André Luis Ornellas

Vice-Presidente

Prof. Hercules Farnesi da Costa Cunha

Coordenador da Revista

Coordenação Geral da Conferência de Medicina do UniSALESIANO

Antônio Henrique Oliveira Poletto

COMISSÃO CIENTÍFICA

José Cândido Caldeira Xavier Júnior

Larissa Martins Melo

COMISSÃO AVALIADORA

Eliane Patrícia Cerverlatti

Henrique Augusto Cantareira Sabino

José Cândido Caldeira Xavier Júnior

Larissa Martins Melo

COMISSÃO ORGANIZADORA

Docentes:

Antônio Henrique Oliveira Poletto
José Cândido Caldeira Xavier Júnior
Larissa Martins Melo
Simone Midori Watanabe

Assistentes de coordenação:

Anne Caroline Barboza

Discentes:

Ana Cecilia de Oliveira
Ayná Emanuelli Alves Barreto
Bruna Letícia de Oliveira
Giovanna Karine Leal Magalhaes
Juliana Akemi Dornellas Tokunaga
Laura Alice Inoue Aguiar
Leonardo Carnevalli Liano
Marcela Abrão Marques
Suzanny Akemi Badaró Toriy

Periodicidade da publicação

Anual

Idiomas

Português

Projeto Gráfico

Prof^o. Maikon Luis Malaquias
Rosiane Cerverizo

MSMT UniSALESIANO Araçatuba

Rodovia Senador Teotônio Vilela, 3.821 - Jardim Alvorada - Araçatuba - SP - Brasil

Tel. (18) 3636-5252

E-mail: unisalesiano@unisalesiano.com.br

Site: www.unisalesiano.edu.br

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A Revista **eUnisalesianoS@ude** aceita apenas artigos inéditos e exclusivos, que não tenham sido publicados e nem que venham a ser publicados em outra revista científica.

A ordem em que aparecem os **nomes dos autores** poderá ser alfabética quando não houver prioridade de autoria, identificando autores, orientadores, professores de metodologia ou conclusão de curso. Havendo prioridade de autoria do artigo, a ordem de colocação dos nomes corresponderá ao primeiro nome sendo o autor principal, e os demais na ordem hierárquica de importância, figurando o nome do orientador por último.

No caso de haver **fotos de pessoas**, os autores deverão providenciar documento de autorização, bem como respeitar a regra de desfocar a imagem – impossibilitando a identificação – do rosto quando se tratar de menores de 18 anos. (art. 5º, inciso X, da constituição federal de 1988).

Em caso de aceite do artigo para publicação, os autores deverão assinar o **Termo de Aceite de Publicação**, disponível no site da revista. Se o trabalho envolver pesquisa **com seres humanos ou outros animais**, deverá ser mencionado o número do processo de autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa, humano (CEAA) e animal (CEUA (Comitê de Ética na Utilização de Animais)).

Os artigos deverão **conter necessariamente entre 8 e 20 páginas contando com as referências**. Para as normas de formatações gerais dos artigos, a revista **eUnisalesianoS@ude** terá como padrão as normas fundamentadas de Vancouver e, para casos específicos, ABNT.

Postagem e endereço eletrônico

Os artigos originais devem ser encaminhados para o endereço eletrônico **esaude@unisalesiano.com.br**

CONTATO

Contato, sugestões de temas para publicações, críticas e contribuições pertinentes podem ser encaminhadas ao e-mail: **esaude@unisalesiano.com.br**

Telefone (18) 3636-5252

Endereço: Rodovia Senador Teotônio Vilela, 3821 - Bairro Alvorada

CEP: 16016-500

Araçatuba / SP - Brasil

ÍNDICE

AÇÕES DO TREINAMENTO FÍSICO RESISTIDO OU TERAPIA HORMONAL COM ESTROGÊNIO NA FUNÇÃO COGNITIVA E ATIVIDADE MOTORA DE RATAS NO PERÍODO DA PERIESTROPAUSA (542133)	14
ALTERAÇÕES COGNITIVAS ASSOCIADAS AO PÓS-COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE (539776)	15
ANÁLISE ACERCA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EM RELAÇÃO AO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM CIDADES DO NOROESTE PAULISTA (542353)	16
ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE HIV E AIDS NO PERÍODO DE 2010 A 2019, NA REGIÃO DE ARAÇATUBA - SP (540647)	17
APLICABILIDADE DO SISTEMA MILÃO PARA NOTIFICAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO CITO-PATOLÓGICA DE GLÂNDULAS SALIVARES: EXPERIÊNCIA DE UMA ÚNICA INSTITUIÇÃO BRASILEIRA (542157)	18
ASSOCIAÇÃO ENTRE VARICOSIDADE LINGUAL E VARICOSIDADE EM MEMBROS INFERIORES EM MULHERES GRÁVIDAS (542212)	19
AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DENGUE ANTES E DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM MUNICÍPIO NO INTERIOR DE SÃO PAULO (542168)	20
AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE PARTOS NORMAIS E CESÁREOS NO SUS NO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (541783)	21
AVALIANDO OS BENEFÍCIOS DA MUSICOTERAPIA EM RECÉM-NASCIDOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (542252)	22
COVID-19 E Acinetobacter baumannii: UMA ANÁLISE DE PREDITORES DE MORTALIDADE (542110)	23

CUSTO-EFICÁCIA DE TRÊS DISTINTAS MODALIDADES DE RASTREIO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NA REALIDADE BRASILEIRA (540526)	24
DAPAGLIFLOZINA E DESFECHOS CEREBROVASCULARES EM UM MUNICÍPIO NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO (542094)	25
EVOLUÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES INTERNADOS NA UTI ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS DE AFERIÇÃO GLICÊMICA - REVISÃO SISTEMÁTICA (542154)	26
FATORES QUE INFLUENCIAM NA DOSAGEM E MONITORAMENTO DO DIABETES MELLITUS (533598)	27
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA REGISTRO E VALIDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR MÉDICOS RESIDENTES (542255)	28
IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA (541895)	29
METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA AOS ESTUDANTES DE MEDICINA DO UNISALESIANO DE ARAÇATUBA-SP (532613)	30
O IMPACTO DA REPRESENTATIVIDADE DA ZONA DE TRANSFORMAÇÃO NA CATEGORIZAÇÃO DE RESULTADOS ALTERADOS DE CITOLOGIA CÉRVICO-VAGINAL (540631)	31
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA NO NOROESTE PAULISTA (542334)	32
PROCEDIMENTOS PARA VASCULARIZAÇÃO PÓS AVCI, UMA META-ANÁLISE (542085)	33
RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO EM UM PACIENTE COM ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE: RELATO DE CASO (540301)	34

REVISÃO SISTEMÁTICA: TROMBOSE VENOSA PROFUNDA DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTES COM COVID-19 (542274)	35
SARAMPO, REAPARECIMENTO EM NOVO CONTEXTO (540339)	36
SAÚDE DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: O CONHECIMENTO DOS PROFIS- SIONAIS DE SAÚDE (540731)	37
TRIAGEM DA LESÃO RENAL DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 POR MEIO DO TESTE RÁPIDO DE AFERIÇÃO DA ALBUMINÚRIA (542164)	38
USO DA FERRAMENTA FRAX® NA PREDIÇÃO DE FRATURAS POR FRAGILIDADES EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DO SEXO MASCULINO (540031)	39
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO	40

REVISTA eUnisalesianoS@ude - 2023 - Edição Especial

ANAIS da Conferência de Medicina do UniSALESIANO - Araçatuba - SP

APRESENTAÇÃO

A revista eUnisalesianoS@úde tem por objetivo promover a publicação semestral de artigos originais ou de revisão em meio digital, contribuindo cientificamente para as áreas biológicas e da saúde enquanto divulga os trabalhos de pesquisa científica das áreas da ciência aplicada à prevenção, manutenção e tratamento de doenças, bem como a promoção de saúde e bem-estar, abrangendo os estudos de iniciação científica, conclusão de cursos e outros da mesma natureza científica.

Nesta Edição Especial, a eUnisalesianoS@úde traz os Anais da Conferência de Medicina do UniSALESIANO, de Araçatuba-SP, já em sua 5ª edição, integrando o calendário oficial desta Universidade desde o ano de 2022. O evento busca, através do ensino, pesquisa e extensão, estimular a iniciação dos alunos no meio acadêmico; promover, através da divulgação de trabalhos, a troca de experiências tanto entre os alunos quanto entre estes e seus professores; e assegurar o reconhecimento institucional destas ações.

Oferece uma oportunidade efetiva de integração dos diferentes setores da pesquisa, da extensão e do ensino. Este ano, buscando estimular o espírito empreendedor de nossos alunos, nas diversas interfaces com as instituições e com a comunidade, foi idealizado os Anais, os quais têm por objetivo incentivar a elaboração de trabalhos científicos pelos acadêmicos.

Nestes compilados, organizados, apresentamos com grata satisfação a primeira edição dos Anais da 5ª Conferência de Medicina do UniSALESIANO, coordenada com esmero pelo Dr. Antônio Henrique Oliveira Poletto, contendo 26 resumos provenientes de distintas áreas do saber no âmbito das ciências da vida e da saúde. Aproveitamos o ensejo para agradecer aos professores pela pronta revisão dos resumos.

Uma boa leitura!

Metodologia Ativa de Ensino e a promoção da autonomia aos estudantes de Medicina do UniSALESIANO de Araçatuba-SP

Active Teaching Methodology and the promotion of autonomy for medical students at UniSALESIANO in Araçatuba-SP

*Maria Eduarda Stringhetta Silvino ¹
Dr. José Marques Filho ²*

RESUMO

Este é um estudo transversal sobre metodologia ativa de ensino e a promoção da autonomia aos estudantes que estão no 2º ano do curso de Medicina do UniSALESIANO de Araçatuba/SP. O trabalho tem como objetivo investigar a influência da metodologia ativa de aprendizagem na formação da autonomia dos estudantes do curso de Medicina com base na percepção dos discentes, que cursaram o ensino médio em metodologia tradicional e iniciaram o curso médico na metodologia ativa de ensino. Secundariamente, consiste em ter uma avaliação subjetiva do discente sobre a qualidade da metodologia ativa de ensino da qual faz parte. Para a metodologia deste estudo foi aplicado um questionário validado com 15 questões aos acadêmicos do segundo ano do curso de medicina. As questões foram respondidas na frente do pesquisador, com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a coleta dos dados os resultados foram analisados qualitativa e quantitativamente. Após a análise dos resultados, estes passaram por comparação para discussão, elaboração do relatório e conclusões finais. Seus resultados ainda estão em processo de recepção e validação documental pela Plataforma Brasil. Para tanto, espera-se que após a análise qualitativa e quantitativa o resultado seja favorável à promoção da autonomia aos estudantes de medicina do UniSALESIANO de Araçatuba-SP.

Palavras-chave: aprendizado baseado em problemas; autonomia; medicina.

¹ Acadêmica do Curso de Medicina - UniSALESIANO

² Docente UniSALESIANO - reumamarques7@gmail.com

Fatores que influenciam na dosagem e monitoramento do Diabetes Mellitus

Factors that influence the dosage and monitoring of Diabetes Mellitus

Maria Helena Alux Azevedo Romero ¹
Prof^ª Dra. Bruna Polacchine da Silva ²
Prof^ª Dra. Rossana Abud Cabrera Rosa ³
Prof. Me. Amanda de Oliveira Furlan ⁴
Prof^ª Dra. Eliane Patrícia Cervelatti ⁵

RESUMO

Diabetes Mellitus, reconhecida como a autodestruição das células β do pâncreas (diabetes tipo 1), ou pela resistência molecular a insulina (diabetes tipo 2), é uma das doenças que mais cresce no Brasil levando estudiosos a buscar novas medidas laboratoriais para diagnóstico precoce para ambos os casos. Desta forma, este estudo tem como objetivo, através de revisão bibliográfica, buscar analisar os possíveis interferentes presentes no exame clínico padrão, hemoglobina glicada, estabelecendo uma correlação com exames utilizados rotineiramente e exames promissores para o monitoramento da doença. Como resultados, notou-se que a nível laboratorial o processamento das amostras e patologias como anemia falciforme afetam diretamente a dosagem da hemoglobina glicada, enquanto a relação social os aspectos culturais e econômicos, étnicos e psicossociais tendem a gerar influência direta no tratamento. Pode-se concluir, assim, que a necessidade de um constante avanço técnico científico no estudo e monitoramento do diabetes mellitus.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Diabetes tipo 1; Hemoglobina glicada.

¹ Acadêmica do Curso de Biomedicina

² Docente – Coorientadora - brunapol@hotmail.com

³ Docente – Coorientadora - rossana@unisalesiano.com.br

⁴ Docente – Coorientadora - furlan_amanda@hotmail.com

⁵ Docente – Orientadora - ecervelatti@hotmail.com

Alterações cognitivas associadas ao pós-COVID-19: uma revisão sistemática com Meta-Análise

*Cognitive changes associated with post-COVID-19:
a systematic review with Meta-Analysis*

Christiane Vicentini Barbosa Maia ¹
Giovanna Kaori Icoma Manzi ²
Letícia Leiko Botini Almeida Hashimoto ³
Nathália Fuzari Tozzo ⁴
Natália Félix Negreiros ⁵
Fabiani Honorato de Barros Lourenço ⁶

RESUMO

Em 2019 um novo coronavírus descrito como SarsCoV-2, potencialmente grave com elevada transmissibilidade estava sendo investigado por diversos autores que sugeriam a capacidade de manifestações neurológicas tardias infecção. Assim, este trabalho tem o objetivo de identificar o risco da COVID-19 para o desenvolvimento de alterações cognitivas tardias. Para isso, utilizou-se de uma revisão sistemática com meta-análise de estudos obtidos nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scielo, entre o período de 2021 e 2022. O descritor Cognitive alteration foi combinado utilizando o operador booleano AND com os descritores: Post Coronavirus e post COVID-19 e seus correspondentes respectivos na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Como resultados, a revisão da literatura revelou 87 artigos científicos. Após a avaliação de duplicatas, escopo e qualitativo, 6 artigos foram selecionados para compor a meta-análise. Nesses, 62% dos pacientes apresentavam alteração do estado cognitivo (teste MoCA < 26). Como conclusão, os artigos selecionados são homogêneos ($p < 0,0001$), não havendo evidências de heterogeneidade das amostras ($p = 0,08$). Desse modo, o COVID-19 constitui um risco para desenvolver alterações cognitivas tardias.

Palavras-chave: COVID-19; Manifestações Cognitivas; pós-COVID-19.

¹ Discente – UniSALESIANO

² Discente – UniSALESIANO

³ Discente – UniSALESIANO

⁴ Discente – UniSALESIANO

⁵ Docente – Coorientador

⁶ Docente – Orientador - fabianihblou@gmail.com

Uso da ferramenta FRAX® na predição de fraturas por fragilidades em idosos institucionalizados do sexo masculino

Use of the FRAX® tool in predicting fragility fractures in institutionalized elderly people male

Matheus Fellipe Lopes Steque ¹
Bruno Jorge Bianchi ²
Eliseu Rodas Martins de Souza ³
Henrique Daher Isique ⁴
Ricardo Luis Simoes Pires Wayhs ⁵
Mário Jefferson Quirino Louzada ⁶
Bruna Gabriele Biffe ⁷

RESUMO

Sendo a ferramenta FRAX® uma importante preditora do risco de fraturas, este estudo quer estimar o risco de fraturas por fragilidade, por meio da FRAX®, em idosos institucionalizados do sexo masculino. Dados clínicos foram coletados de prontuários médicos de 14 idosos, com idade entre 60 a 90 anos. Posteriormente, os dados foram inseridos na ferramenta digital FRAX®, que calculou a predição de fraturas por fragilidade para um período de dez anos. As correlações foram obtidas pelo coeficiente de correlação de Pearson, considerando $p < 0,05$. Como resultados, a idade média foi de $75,8 \pm 8,37$ anos e o peso médio foi de $72,8 \pm 21,63$ quilos. De acordo com a FRAX®, a probabilidade de fratura por osteoporose maior é de $4,33 \pm 2,52$ e a de fratura de quadril é de $2,37 \pm 2,06$. A idade se correlacionou positivamente com probabilidade de fratura por osteoporose maior ($r=0.79$; $p=0.0006$) e probabilidade de fratura de quadril ($r=0.79$; $p=0.008$). O peso se correlacionou negativamente com probabilidade de fratura por osteoporose maior ($r=-0.65$; $p=0.011$) e probabilidade de fratura de quadril ($r=-0.69$; $p=0.005$). Assim, pode-se concluir que, pela FRAX®, o aumento da idade e a redução do peso predizem maior probabilidade do risco de fraturas por fragilidade em idosos institucionalizados.

Palavras chave: Envelhecimento; Fragilidade óssea; Fraturas osteoporóticas.

¹ Discente do curso de Medicina

² Discente do curso de Medicina

³ Discente do curso de Medicina

⁴ Discente do curso de Medicina

⁵ Docente do curso de Medicina

⁶ Docente do curso de Medicina

⁷ Orientadora – Docente do curso de Medicina – brunabiffe@gmail.com

Raciocínio diagnóstico em um paciente com Anemia Hemolítica Auto-Imune: relato de caso

Diagnostic reasoning in a patient with Autoimmune Hemolytic Anemia: case report

Fernanda Ribeiro Dalarmi ¹
Dra. Ana Clara Baz Lauretto ²
Dr. Rafael Saad ³

RESUMO

A Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) é uma patologia em que imunoglobulinas dirigidas contra antígenos na membrana eritrocitária induzem à hemólise precoce. Pode ser classificada em primária e secundária à infecção, doenças sistêmicas ou induzida por fármacos. Os subtipos são conforme a reatividade do autoanticorpo à temperatura: AHAI quente, fria (incluindo Doença por Crioaglutininas - CAD) ou mista. Na CAD, as crioaglutininas provocam aglutinação e hemólise extravascular em temperaturas abaixo de 37°C. Este trabalho tem como objetivo relatar o quadro clínico e alterações laboratoriais de um paciente com AHAI. Como metodologia, utilizou-se de dados obtidos através de revisão de prontuário médico hospitalar. Nos resultados, um homem, 60 anos, iniciou calafrios, febre, fraqueza e palidez há 1 semana, coincidindo com queda de temperatura na cidade. Apresentou icterícia, hepatoesplenomegalia, anemia grave e pneumonia. Solicitado transfusão de concentrado de hemácias, tendo provas de compatibilidade alteradas, testes de hemólise positivos, sorologias negativas e biópsia de medula óssea sem malignidade. Presença de crioaglutininas, IgM kappa monoclonal e Coombs direto monoespecífico C3d confirmaram CAD. O tratamento incluiu glicocorticoide, imunoglobulina, antibioticoterapia e recomendação para evitar exposição ao frio. Como conclusão, observou-se que o caso denota o desafio da identificação das etiologias da AHAI e a importância dos exames complementares para diferenciação dos subtipos.

Palavras-chave: Anemia hemolítica autoimune; Doença por crioaglutininas; Hemólise.

¹ Acadêmica do curso de Medicina

² Docente do curso de Medicina – Orientadora - analauretto@gmail.com

³ Docente do curso de Medicina – Orientador - rafaelsaad89@gmail.com

Sarampo: reaparecimento em novo contexto

Measles: reappearance in a new context

*Caio Rodrigo dos Santos*¹

*Carina Dutra Afonso*²

*Carlos Eduardo Pereira de Carvalho*³

*Carlos Henrique Carli*⁴

*Professora Doutora Fernanda Maria Veanholi Vechiato Rainha*⁵

*Professor Doutor Henrique Augusto Cantareira Sabino*⁶

RESUMO

O Brasil, através do Programa Nacional de Imunização, havia conquistado o certificado de erradicação do sarampo no ano de 2016. Porém, a partir de 2018, novos casos acarretaram uma mudança alarmante nesse cenário. Diante destes primeiros dados, quer-se identificar, através da taxa de vacinação, a proteção efetiva da população perante o risco de novos surtos de sarampo. Esta pesquisa é documental, ecológica, de caráter exploratório, quantitativa descritiva, com delineamento longitudinal. Realizada através de dados obtidos no DATASUS, abordando o número de casos de sarampo e óbitos no período de 2017 a 2022, a cobertura vacinal do tríplice viral, com duas doses no período de 2013 a 2022, no estado de São Paulo, e a distribuição de casos confirmados no período de 2018 a 2021 no Brasil. Como resultados, em 2019, São Paulo teve um pico de 18.013 casos e 18 óbitos, observando-se uma redução na porcentagem da cobertura vacinal no mesmo período, ficando abaixo de 80%. Nacionalmente foi registrado 20.901 casos em 2019. Como conclusão, os dados sugerem haver uma relação direta entre o ressurgimento do sarampo e a queda na cobertura vacinal das duas doses preconizadas, somase ainda a uma falta de conscientização da população perante importância da prevenção primária.

Palavras-chave: Ressurgimento; Sarampo; Vacina.

¹ Acadêmico do curso de Medicina

² Acadêmico do curso de Medicina

³ Acadêmico do curso de Medicina

⁴ Acadêmico do curso de Medicina

⁵ Orientadora – Docente do curso de Medicina - fernandavechiato_med@salesiano.com.br

⁶ Orientador – Docente do curso de Medicina

Custo-Eficácia de três distintas modalidades de Rastreio do Câncer do Colo do Útero na realidade brasileira

Cost-Effectiveness of three different modalities of Cervical Cancer Screening in the Brazilian reality

Daniel José Castilho da Silva ¹
Caio Rodrigo dos Santos ²
Felipe Polido Urbano ³
Gabriel Russo Cury ⁴
José Cândido Caldeira Xavier Júnior ⁵

RESUMO

Dentre os casos de óbitos por câncer, 7,8% são causados por câncer do colo do útero. Com base nestes dados, quer-se com este estudo alcançar o objetivo de realizar uma avaliação comparativa da aplicabilidade de três modalidades de rastreio do câncer de colo do útero na realidade brasileira: o modelo de rastreamento vigente, o modelo americano e o modelo proposto pela Organização Mundial da Saúde em 2021. Como metodologia, foi realizada uma revisão retrospectiva observacional documental com a abordagem quantitativa descritiva, com coleta de dados de 2020 e estimativas até 2030, sobre sistema de dados oficial no Brasil e avaliação do custo da aplicação de cada um dos três programas. Como resultado, o protocolo brasileiro baseado na citologia convencional tem valor total estimado de US\$ 696.824.616,24, o americano US\$ 4.359.218.060,63 que utiliza cotestes (citopatologia líquida e teste DNA-HPV) da Organização Mundial da Saúde US\$ 3.763.826.503,61 que utiliza teste DNA-HPV. Para comparação, toda a verba destinada à saúde no Brasil em 2020 foi de US\$35.259.496.051,14. Diante deste estudo, pode-se concluir que, dentre eles, o brasileiro tem o menor custo, sendo o único que se adequaria ao aporte financeiro destinado à saúde no nosso país, apresentando boa sensibilidade e especificidade para um programa de rastreio.

Palavras-chave: Câncer do colo do útero; Programas de rastreamento; Teste de Papanicolau.

¹ Discente do curso de Medicina

² Discente do curso de Medicina

³ Discente do curso de Medicina

⁴ Discente do curso de Medicina

⁵ Instituto de Patologia de Araçatuba – Faculdade de medicina UNESP - josecandidojr@yahoo.com.br

O impacto da representatividade da zona de transformação na categorização de resultados alterados de citologia Cérvico-Vaginal

The impact of the representation of the transformation zone on the categorization of altered Cervico-Vaginal cytology results

Renata Alfena Zago ¹
Dr. José Cândido Caldeira Xavier-Júnior ²

RESUMO

O programa brasileiro de rastreamento do câncer do colo do útero não considera a representação da zona de transformação (ZT) para avaliar esfregaços cérvico-vaginais e caracterizar a amostra em satisfatória ou insatisfatória. Diante desta observação, quer-se com este trabalho alcançar o objetivo de comparar a frequência de resultados alterados de citologia cervical com e sem representação da ZT em cidade de médio porte do Brasil. Como metodologia, o estudo será observacional analítico retrospectivo que avaliou resultados de citologia cervical ao longo de 22 anos em esfregaços convencionais no Sistema Único de Saúde na região de Araçatuba. Os resultados foram obtidos pela aplicação do teste χ^2 . Como resultados, foram avaliados 261.881 exames, 159.251 com e 102.630 sem representação da ZT. A frequência de alterações foi maior nos esfregaços com representação da ZT (OR 4.03; IC 95% [3.71-4.38]), sendo as categorias ASC-US (OR 3.45; IC 95% 3.11-3.81), ASC-H (OR 5.01; IC 95% 3.87-6.49, LSIL (OR 3.73; IC 95% 3.02-4.62) e HSIL (OR 8.63; IC 95% 5.64-13.18) mais relevantes, inclusive para mulheres entre 25 e 64 anos, alvo das diretrizes nacionais. Assim, as amostras com representação da ZT associam-se a taxas mais elevadas de resultados alterados. Assim, profissionais de saúde devem-se atentar aos tipos celulares amostrados, considerando a possibilidade de falso-negativos quando não representada a ZT.

Palavras-chave: HPV; Neoplasias do Colo do Útero; Teste de Papanicolau.

¹ Acadêmica de Medicina.

² Orientador; Docente do curso de Medicina; josecandidojr@yahoo.com.br

Análise da incidência de HIV e AIDS no período de 2010 a 2019, na região de Araçatuba – SP

Analysis of the incidence of HIV and AIDS from 2010 to 2019, in the region of Araçatuba – SP

Ana Livia de Mattos ¹
Beatriz de Oliveira Marques ²
Gabriela Caserta Mestrenner Messias ³
Taísy Simões Bazzo ⁴
Luciana Coimbra de Mello ⁵

RESUMO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é transmitido através do contato com fluidos corporais contaminados, podendo evoluir para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids), fase mais avançada do espectro da infecção crônica. Este trabalho se destina a analisar a taxa de incidência dos casos notificados com diagnóstico de infecção pelo HIV e com diagnóstico de aids. Como metodologia, este estudo será descritivo, por observação sistemática que possibilitou o levantamento, coleta e registro dos dados, referentes a região de Araçatuba – SP, através dos boletins epidemiológicos dos anos de 2010 a 2019. Quer-se alcançar resultados de 1.955 casos notificados, sendo que 923 foram diagnosticados com HIV e 1.032 com aids. Ao final, a percepção é de que a taxa de incidência da aids teve redução de 41% no período (de 14,7 casos por 100.000 habitantes em 2010 para 8,6 em 2019). A taxa de detecção de casos com infecção pelo HIV apresentou variações no período. Em relação ao ano de 2010, o ano de 2019 apresentou redução de 4,6% (de 11,7 casos por 100.000 habitantes, para 11,1 casos, respectivamente). A redução da taxa de incidência da aids evidencia que o aumento da oferta de testes rápidos nos serviços de atenção primária, possibilita o diagnóstico precoce e o melhor controle da infecção, evitando estágios avançados da doença.

Palavras-chave: Diagnóstico precoce. HIV. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

¹ Acadêmica do curso de Medicina

² Acadêmica do curso de Medicina

³ Acadêmica do curso de Medicina

⁴ Acadêmica do curso de Medicina

⁵ Docente do curso de medicina; Orientadora - lucianamello_med@unisalesiano.com.br

Saúde dos adolescentes em conflito com a Lei: o conhecimento dos profissionais de saúde

*Health of adolescents in conflict with the Law:
the knowledge of health professionals*

Iasmim Alves Palhota de Lima ¹
Larissa de Lima Ávila ²
Larissa Tatibana de Lima ³
Natália Gabriela de Carvalho ⁴
Natália Zaiter ⁵
Prof. Esp. Ricardo Burato Dias ⁶

RESUMO

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI) tem como finalidade promover a melhor adesão e operacionalização do amparo à saúde integral aos adolescentes desprovidos de liberdade, além de facilitar a inclusão dessa população no Sistema Único de Saúde. Assim, quer-se verificar o conhecimento sobre a PNAISARI dos profissionais de saúde que prestam atendimento a esses adolescentes em Araçatuba. Como metodologia, será a adotada a pesquisa de campo, de caráter observacional, aplicada, explicativa, de abordagem quantitativa analítica, com delineamento transversal. Realizada mediante aplicação presencial de um questionário estruturado e elaborado pelos pesquisadores que buscou obter informações sociodemográficas dos participantes e avaliar o seu entendimento acerca da política. Os resultados, quanto ao conhecimento dos participantes a respeito da PNAISARI, 63% (n=84), responderam que não conheciam a política. Verificou-se que o ponto de referência de atendimento e a realização prévia de treinamento foram fatores dependentes para o seu conhecimento, com valores de $p < 0,05$. Desta forma, a maioria dos profissionais não conhece a política e não foi capacitada para prestar atendimento a esse público, evidenciando que há falhas na implantação da PNAISARI no município. Ressalta-se ainda a necessidade de mais estudos sobre o tema, haja vista a carência de produção científica existente.

Palavras-chave: PNAISARI; Adolescente; Regime socioeducativo.

¹ Acadêmica do curso de Medicina

² Acadêmica do curso de Medicina

³ Acadêmica do curso de Medicina

⁴ Acadêmica do curso de Medicina

⁵ Acadêmica do curso de medicina

⁶ Docente do curso de medicina – Orientador - ricardoburato@hotmail.com

Avaliação da incidência de partos normais e cesáreos no SUS no Município de Araçatuba

Assessment of the incidence of normal and cesarean births in the SUS in the Municipality of Araçatuba

Bruna Letícia Buzati Pereira ¹

Beatriz Caires Lima Bazallia ²

Bianca Santana de Souza ³

Bianca Juvencio dos Santos ⁴

Prof. Dra. Fernanda Maria Veanholi Vechiato Rainha ⁵

Prof. Dr. Henrique Augusto Cantareira Sabino ⁶

RESUMO

Parto cesáreo (PC) é definido como a via de parto pela qual o feto nasce através de um procedimento cirúrgico. Apesar do maior risco de infecções, trombose e hemorragias, tem sido opção de escolha devido ao medo do parto normal (PN), receio de lacerações e à falta de informação. Este trabalho tem o objetivo de caracterizar a incidência de PC, no Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Araçatuba. Para isso, utilizou-se como metodologia o estudo documental, observacional, quantitativo, descritivo, com delineamento longitudinal, no período de 2016 a 2019. Dados retirados do DATASUS e da Secretaria de Estado da Saúde utilizando-se os filtros: ano, município, porcentagem de PC e de PN em Araçatuba e no Departamento Regional de Saúde (DRS)II, composto por 40 municípios. Como resultados, a porcentagem de PN aumentou de 22,11% para 26,42% e PC de 72,37% para 80%, sendo o preconizado de 15% pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A porcentagem de PC em Araçatuba, no SUS, quando comparada à DRSII, foi de 24,45% em 2016 para 0,71% em 2019. Como conclusão, observou-se que dos municípios da DRSII, Araçatuba teve a maior queda percentual de PC. No entanto, a porcentagem de PC de Araçatuba, nos períodos avaliados, continuou acima do preconizado pela OMS.

Palavras-chave: Parto cesáreo; Parto normal; Araçatuba.

¹ Acadêmica do curso de Medicina

² Acadêmica do curso de Medicina

³ Acadêmica do curso de Medicina

⁴ Acadêmica do curso de Medicina

⁵ Orientadora – Docente do curso de Medicina - fernandavechiato_med@salesiano.com.br

⁶ Orientador – Docente do curso de Medicina

Importância do pré-natal nos casos de Sífilis Congênita

Importance of prenatal care in cases of Congenital syphilis

Damaris Rodrigues da Conceição ¹
Ligia Arabe Lima ²
Laura Mendes Guedes ³
Letícia Cazarré Nascimento ⁴
Julia Carvalho de Souza ⁵
Profa. Nathália de Oliveira Cardoso ⁶

RESUMO

A Sífilis Congênita constitui a segunda causa de aborto mundial, associando-se ao pré-natal inadequado. A doença é passível de prevenção, tratamento e cura; entretanto, ainda é um problema de saúde pública. Este trabalho tem por objetivo analisar o impacto do pré-natal e sua influência no diagnóstico, tratamento e desfecho precoce da transmissão da sífilis congênita. Utilizou-se como metodologia o estudo observacional, aplicado, quantitativo analítico, longitudinal retrospectivo e documental realizado em Araçatuba, São Paulo, com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação nos anos de 2018 a 2021. Como resultados, os dados evidenciaram aumento no diagnóstico tardio e nos desfechos negativos quando realizado pré-natal inadequado. Os neonatos em que a mãe obteve o diagnóstico pós-parto apresentaram mais manifestações clínicas (57,1%) do que aqueles em que as mães foram diagnosticadas antes do nascimento (13,7%). Ademais, em 2021, houve aumento no número de diagnosticados (32,3%) e, surpreendentemente, diminuição nos neonatos tratados (71,4%). Apesar da tentativa de erradicar a sífilis congênita, ainda há aumento progressivo no número de casos. Logo, sugere-se melhoria na assistência ao pré-natal, através de maior vínculo entre atenção básica e gestantes, diagnóstico rápido e tratamento completo, a fim de reduzir a ocorrência da doença e prevenir suas complicações.

Palavras-chave: Diagnóstico; Prevenção; Transmissão vertical.

¹ Acadêmica do curso de Medicina

² Acadêmica do curso de Medicina

³ Acadêmica do curso de Medicina

⁴ Acadêmica do curso de Medicina

⁵ Acadêmica do curso de Medicina

⁶ Profa. Orientadora – nathalia100407@gmail.com

Procedimentos para Vascularização pós-AVCI: uma meta-análise

Procedures for post-stroke vascularization: a meta-analysis

Leonardo Ambrosio Domingues ¹

Rafael Guedes Ferreira ²

Fernando Buzeti Garcia ³

Profa. Natalia Felix Negreiros ⁴

RESUMO

As doenças cerebrovasculares são um grupo de patologias clínicas, consideradas a segunda causa de mortalidade da população brasileira. Entre elas, destacam-se o acidente cerebral vascular isquêmico, caracterizado por sequelas, que comprometem a funcionalidade e autonomia. Assim é de extrema importância os tratamentos serem eficazes, com o intuito de reduzir os índices de morbimortalidade, melhorando a qualidade de vida. Este trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão sistemática com metanálise referente às estratégias de revascularização, enfatizando a técnica de trombectomia mecânica e seu desfecho em relação às demais vertentes de tratamento. Para isso, realizou-se pesquisa em bancos de dados comparando trombectomia mecânica com trombolítico intravenoso (MT+IVT) em relação à Trombectomia mecânica direta (DMT), ambos com oclusão na artéria cerebral média (ACM) quanto à escala Rankin de autonomia pós 90 dias do incidente. Obtido os odds ratio (OR) com 95% de confiança entre os grupos e submetidos meta-análise de efeitos fixos pelo modelo Mantel-Haenszel. Os ORs foram calculados nos grupos MT+IVT versus DMT dentro dos subgrupos avaliados e feito análise por funnel plot. Como resultados, o Rankin dos sete estudos foram concordantes, demonstrando superioridade do tratamento combinado, resultando em um OR 1.43 (1.21 - 1.71) 95% CI. Assim, a terapia combinada apresenta melhor Rankin com significância estatística.

Palavras-chave: AVC; Revascularização; Trombectomia.

¹ Acadêmico do curso de Medicina

² Acadêmico do curso de Medicina

³ Acadêmico do curso de Medicina

⁴ Docente do curso de Medicina – Orientadora - natalianegreiros_med@unisalesiano.com.br

Dapagliflozina e Desfechos Cerebrovasculares em um município no interior do Estado de São Paulo

Dapagliflozin and Cerebrovascular Outcomes in a municipality in the interior of the State of São Paulo

Leonardo Ambrosio Domingues ¹

Rafael Guedes Ferreira ²

Fernando Buzeti Garcia ³

Profa. Natalia Felix Negreiros ⁴

Angelo Cesar Jacomossi ⁵

RESUMO

A Diabetes *Mellitus* tipo 2 (DM2) é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo e um fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades. Entre essas, destacam-se as cardiovasculares e cerebrovasculares por apresentarem a maior morbimortalidade e onerosidade ao Sistema Único de Saúde. Contudo, o entendimento da patogênese dessas enfermidades tem possibilitado opções terapêuticas e preventivas promissoras quanto à morbimortalidade e qualidade de vida das doenças cardiovasculares em estudos norte americanos e europeus. Em contrapartida, a proteção cerebrovascular desses novos tratamentos permanece incerta. Assim, o objetivo desta pesquisa se prende em mensurar o risco relativo entre a Dapagliflozina, um novo fármaco para o tratamento da DM2, e demais medicamentos para controle da comorbidade quanto ao desenvolvimento de doenças cerebrovasculares, com intuito de fornecer evidências quanto ao seu efeito protetivo. Como método, utilizou-se o estudo de caso-controle, baseado em revisão de prontuários médicos de um centro de saúde da cidade de Santo Antônio do Aracanguá - SP entre 2016 e 2022. Os pacientes foram classificados em grupo de interesse (Dapagliflozina) e controle (demais medicamentos) onde análises de subgrupo serão empregadas de acordo com as particularidades pré-existentes por meio de critérios de inclusão padronizados visando diminuir vieses. Os pacientes deverão ter feito uso das medicações por minimamente 180 dias.

Palavras-chave: Dapagliflozina; Diabetes Mellitus; Doença Cerebrovascular.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina

² Acadêmico do Curso de Medicina

³ Acadêmico do Curso de Medicina

⁴ Docente no Curso de Medicina – Orientadora - natalianegreiros_med@unisalesiano.com.br

⁵ Docente no Curso de Medicina - Orientador

COVID-19 e *Acinetobacter baumannii*: uma análise de preditores de mortalidade

COVID-19 and Acinetobacter baumannii: an analysis of mortality predictors

Alexandre Henrique da Silva ¹
Alícia de Assis Silvério Gonçalves ²
Beatriz Parpinelli Scarpin ³
Bruna Harumi Shiraishi ⁴
Prof. Vinicius Nakad Orsatti ⁵

RESUMO

O vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia de COVID-19, foi responsável pelo aumento significativo nas taxas de internação em unidade de terapia intensiva. Neste cenário, a coinfeção por *Acinetobacter baumannii* se mostrou relevante, com altas taxas de mortalidade envolvendo os pacientes infectados com ambos os patógenos. Diante destas informações, quer-se analisar preditores de mortalidade do binômio COVID-19 e *Acinetobacter baumannii* em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Utilizou-se o método que, através de um banco de dados observacional, foram analisados dados epidemiológicos (sexo, idade) e clínicos (comorbidades, procedimentos médicos invasivos), de pacientes infectados por SARS-CoV-2 e *Acinetobacter baumannii*. Realizada análise quantitativa analítica, com teste de qui-quadrado de Person, para constatar significância estatística entre variável e desfecho. Como resultados, foram incluídos 129 pacientes, com idade média de 58 anos, e amostra majoritariamente masculina. Dentre as variáveis analisadas, a faixa etária obteve significância estatística (valor de $p = 0,001$), demonstrando relação entre idade e desfecho. Outras variáveis, surpreendentemente, não demonstraram significância estatística. Como conclusão, apesar de inúmeras comorbidades avaliadas, em um grupo amostral significativo, somente a idade se mostrou um preditor de mortalidade, demonstrando, possivelmente, que a coinfeção por *Acinetobacter baumannii* funciona como fator independente para a mortalidade nos pacientes com COVID-19.

Palavras chaves: *Acinetobacter baumannii*. COVID-19. Unidade de terapia intensiva.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina

² Acadêmica do Curso de Medicina

³ Acadêmica do Curso de Medicina

⁴ Acadêmica do Curso de Medicina

⁵ Docente no Curso de Medicina – Orientador - viniciusnakad@gmail.com

Ações do Treinamento Físico Resistido ou Terapia Hormonal com Estrogênio na função cognitiva e atividade motora de ratas no período da Periestropausa

Actions of Resistance Physical Training or Hormonal Therapy with Estrogen on the cognitive function and motor activity of rats during the Periestropause period

Beatriz Procópio Stringheta ¹
Thainá Daguane Esperança ²
Débora Prazias Cavalcante ³
Luana Galante Douradinho ⁴
Ana Beatriz Dona Fiorotto ⁵
Fernanda Barbosa Lima ⁶
Rita Cássia Menegati Dornelle ⁷

RESUMO

Transição do ciclo regular para irregular caracteriza perimenopausa e possíveis declínios neuronais influenciam-se endogenamente e exogenamente, onde estradiol e exercício físico modulam alterações cognitivas e motoras. Diante destas informações, o objetivo deste trabalho de pesquisa se prende em avaliar respostas ansiolíticas, memória de curto e longo prazo e marcha de ratas periestropausadas após terapia hormonal com estrogênio (THE) ou treinamento físico resistido (TRF). Como método de pesquisa, realizou-se testes de labirinto em cruz em quarenta ratas, elevado, reconhecimento de objetos e deambulação aos 17 e 21 meses, distribuindo-se: não treinados (21Me/NT), TRF (21Me/TRF; 3x/semana), veículo (21Me/Ve; óleo de milho/0,2 mL/SC; 2x/semana), e THE (21Me/E2; 17 β -estradiol/15 μ g/Kg/SC; 2x/semana) (CEUA nº 0585-2021). Como resultados, apontou-se nos grupos 21Me/TRF e 21Me/E2 o aumento do tempo e entradas nos braços abertos, comparados aos demais grupos. Memória de curto e longo prazo melhoraram no grupo 21Me/TRF comparado aos grupos 17Me e 21Me/NT, porém, o grupo 21Me/E2 apresentou manutenção desse índice em relação aos 17 meses. TF aumentou comprimento e diminuiu largura da passada após intervenções quando comparados os grupos 17Me e 21Me. Como conclusão, E2 ou TRF exógeno na periestropausa melhora perfil ansiolítico, função cognitiva e atividade da marcha, reforçando a importância destes na preservação funcional anteriormente desempenhadas, sendo exploradas para prevenção de distúrbios neuropsicológicos e neurodegenerativos.

Palavras-chave: Perimenopausa; Exercício físico; Terapia de reposição estrogênica.

¹ Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, SBFis - UNESP

² Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, SBFis - UNESP

³ Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, SBFis - UNESP

⁴ Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, SBFis - UNESP

⁵ Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, SBFis - UNESP

⁶ Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis, Santa Catarina - UFSC

⁷ Departamento de Ciências Básicas, Faculdade de Odontologia – UNESP – Orientadora - rita.dornelles@unesp.br

Evolução clínica de pacientes internados na UTI através dos protocolos de Aferição Glicêmica – Revisão Sistemática

Clinical evolution of patients admitted to the ICU using Glycemic Measurement protocols – Systematic Review

Suzanny Akemi Badaró Toriy¹
Fábio Barreto Sabatin de Oliveira²
Leonardo Ambrósio Domingues³
Juliana Akemi Dornellas Tokunaga⁴
Eduardo Augusto de Souza Peres⁵
Samuel da Cunha Sanches⁶
Maria Luiza Venancio de Paula⁷
Fernanda da Rocha Ceccatto⁸
Barbara Rafael Carneiro⁹
Rafael de Oliveira Leite da Silva¹⁰
VanessaYurie Shiraishi¹¹
Caio Gabriel Gonçalves da Silva¹²
José Guilherme Batista Pinto¹³
Angelo César Jacomossi¹⁴
Larissa Martins Melo¹⁵
Natália Félix Negreiros¹⁶

RESUMO

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica na qual o organismo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, resultando em deterioração progressiva do controle glicêmico. Tem alta relevância médica, pois apresenta altos índices de mortalidade e gera diversos gastos hospitalares em cuidados médicos. Quando internados, os pacientes frequentemente apresentam hiperglicemia, principalmente se em estado crítico. O controle glicêmico rigoroso está associado a desfechos clínicos positivos, incluindo a redução da mortalidade. Apesar disso, é notório em muitas unidades de terapia intensiva esquemas de monitorização glicêmica falhos, insuficientes para gerar níveis glicêmicos adequadamente controlados. A fim de melhorar a evolução clínica, diversos estudos avaliam os benefícios do controle glicêmico em pacientes internados. Assim, este trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão sistemática de estudos que analisam a variação dos níveis glicêmicos, em pacientes em unidades de terapia intensiva, associada a desfechos clínicos diversos. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa em base de dados online PubMed e Scielo, nas quais foram realizadas levantamento da produção científica sobre o assunto, utilizando descritores segundo a estratégia PRISMA, com inclusão de revisões sistemáticas dos últimos 10 anos e exclusão dos artigos duplicados.

Palavras-chave: Complicações do Diabetes; Controle Glicêmico; Hiperglicemia.

¹ Acadêmica do Curso de Medicina
² Acadêmico do Curso de Medicina
³ Acadêmico do Curso de Medicina
⁴ Acadêmica do Curso de Medicina
⁵ Acadêmico do Curso de Medicina
⁶ Acadêmico do Curso de Medicina
⁷ Acadêmica do Curso de Medicina
⁸ Acadêmico do Curso de Medicina
⁹ Acadêmico do Curso de Medicina
¹⁰ Acadêmico do Curso de Medicina
¹¹ Acadêmico do Curso de Medicina
¹² Acadêmico do Curso de Medicina

Aplicabilidade do Sistema Milão para notificação de Caracterização Ciptológica de Glândulas Salivares: experiência de uma única instituição Brasileira

Applicability of the Milan System for notification of Cypathological Characterization of Salivary Glands: experience from a single Brazilian institution

Juliana Akemi Dornellas Tokunaga ¹
Eduardo Augusto de Souza Peres ²
José Cândido Caldeira Xavier Júnior ³

RESUMO

A incidência de neoplasias de glândulas salivares cresce, na tentativa de estabelecer protocolos criou-se o Sistema Milão que classifica amostras citológicas obtidas por punção aspirativa por agulha fina em uma dentre seis categorias que apresentam diferentes riscos de malignidade. Este trabalho tem o objetivo de comparar, pela primeira vez, dados brasileiros, de uma instituição do interior do estado de São Paulo, com o esperado pelo Sistema Milão e avaliar se a taxa de concordância com o diagnóstico histopatológico é adequada. Com a metodologia de estudo observacional, analítico, retrospectivo comparou-se resultados citológicos e histopatológicos entre janeiro de 2016 e junho de 2020 no Instituto de Patologia de Araçatuba. Os resultados mostraram que a peça cirúrgica estava disponível para 58 dos 96 casos (60,42%) para acompanhamento histopatológico; o risco de malignidade para cada categoria foi 16,67% (I. Não-diagnóstico), 0% (II. Não-neoplásico), 0% (III. Atipias de significado indeterminado), 2,86% (IV-A. Neoplasia benigna), 50% (IV-B. Neoplasia de glândula salivar de potencial maligno incerto), 100% (V. Suspeito para malignidade), 100% (VI. Maligno); e a taxa de discordância de 7,69%. Como conclusão, o Sistema Milão mostrou-se adequado para estratificar o risco, guiar tratamento e definir prognóstico dos pacientes uma vez que o risco de malignidade obtido foi similar ao esperado e a taxa de discordância foi relativamente baixa.

Palavras-chave: Biópsia por Agulha Fina; Citologia; Neoplasias das Glândulas Salivares.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina

² Acadêmico do Curso de Medicina

³ Docente no Curso de Medicina - Orientador - josecandidojr@yahoo.com.br

Triagem da Lesão Renal de Pacientes Diabéticos Tipo 2 por meio do teste rápido de Aferição da Albuminúria

Screening for Kidney Injury in Type 2 Diabetic Patients Using the Rapid Albuminuria Measurement Test

Fábio Barreto Sabatin de Oliveira ¹
Suzanny Akemi Badaró Toriy ²
Leonardo Ambrósio Domingues ³
Akemi Dornellas Tokunaga ⁴
Eduardo Augusto de Souza Peres ⁵
Samuel da Cunha Sanches ⁶
Maria Luiza Venâncio de Paula ⁷
Fernanda da Rocha Ceccatto ⁸
Barbara Rafael Carneiro ⁹
Rafael de Oliveira Leite da Silva ¹⁰
Vanessa Yurie Shiraishi ¹¹
Caio Gabriel Gonçalves da Silva ¹²
José Guilherme Batista Pinto ¹³
Isabella Giulia Silva Nardo ¹⁴
Prof. Ângelo César Jacomossi ¹⁵

RESUMO

Diabetes Mellitus do tipo 2 é um distúrbio multissistêmico de impacto global responsável pela morbimortalidade de milhões de pacientes por ano, com prevalência de 7,6% no início da década de 90 e aumento estimado para 2025 de 178%. Em brasileiros com diabetes tipo 2, observou-se uma incidência, de nefropatia diabética, em 10 anos, de 31%, logo, cerca de um terço desses indivíduos serão acometidos por essa complicação crônica microvascular frequente, cujo manejo é muito dispendioso ao Estado e com o agravamento aumenta os gastos exponencialmente. Este trabalho tem como objetivo identificar precocemente essa complicação em pacientes assistidos na atenção primária a fim de reduzir a progressão para doença renal avançada e terapia substitutiva renal, reduzindo a sobrecarga do Sistema Único de Saúde. Para isso realizar-se-ão testes rápidos de aferição de albuminúria em pacientes das Unidades Básicas dos municípios selecionados a partir de critérios de inclusão e exclusão previamente informado e aceitos pelo Comitê de Ética e Pesquisa desta instituição. Utilizou-se como método, para isso, o estudo experimental transversal analítico. As informações serão retiradas através de tabulação dos dados obtidos após aferição do teste rápido de albuminúria. Os resultados serão de diabéticos tipo 2, independente do sexo, com taxa de filtração glomerular maior que 45, estimando-se aproximadamente 300 indivíduos.

Palavras-chave: Albuminúria; Complicações do Diabetes; Injúria Renal Aguda.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina
² Acadêmica do Curso de Medicina
³ Acadêmico do Curso de Medicina
⁴ Acadêmico do Curso de Medicina
⁵ Acadêmico do Curso de Medicina
⁶ Acadêmico do Curso de Medicina
⁷ Acadêmica do Curso de Medicina
⁸ Acadêmica do Curso de Medicina
⁹ Acadêmica do Curso de Medicina

Avaliação da incidência de Dengue antes e durante a Pandemia de COVID-19 em município no interior de São Paulo

Assessment of the incidence of Dengue before and during the COVID-19 Pandemic in a municipality in the interior of São Paulo

Rhuan Enciso ¹
Thais Sanches Guilhen ²
Raquel Castilho Martello ³
Rafaela Yori Rocha⁴
Rafael Campos ⁵
Profa. Dr. Fernanda Maria Veanholi Vechiato Rainha ⁶
Prof. Dr. Henrique Augusto Cantareira Sabino ⁷

RESUMO

Diversos fatores podem alterar a notificação da incidência de dengue, sobretudo em um momento como a pandemia da COVID 19. Assim, este trabalho tem como objetivo identificar fatores que causaram diferença endêmica de dengue nos períodos de pré-pandemia e pandemia de Covid-19 na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. Utilizou-se para isso, a pesquisa documental, ecológica, exploratória, quantitativa e descritiva, com delineamento longitudinal, realizada através de dados obtidos no Tabnet/DATASUS, Agritempo e Seade, de 2019 a 2021. Utilizando os filtros: mês, ano e município. Como resultados, a maior incidência de dengue em 2019 foi no mês de maio (8827 casos), quando comparados os mesmos meses nos anos de 2020 e 2021 houve uma queda, sendo 1173 e 2634 casos respectivamente. Foi observado no auge de julho de 2020, 3047 notificações de COVID, as de dengue caíram para 290 no mesmo mês, mantendo-se abaixo das de COVID até abril de 2021, mesmo sem alteração no padrão pluvial no período. Como conclusão, sugere-se que não houve mudança climática neste período, justificando a diferença na incidência de dengue. Ademais, suspeita-se de subnotificação de dengue por conta da pandemia Covid-19, principalmente nos períodos em que o distanciamento social estava vigente, com poucos testes para comprovação diagnóstica.

Palavras-chave: Covid-19; Dengue; Epidemiologia.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina

² Acadêmica do Curso de Medicina

³ Acadêmica do Curso de Medicina

⁴ Acadêmica do Curso de Medicina

⁵ Acadêmico do Curso de Medicina

⁶ Docente no Curso de Medicina - Orientador

⁷ Docente no Curso de Medicina - Orientador - fernandavechiato_med@salesiano.com.br

Associação entre Varicosidade Lingual e Varicosidade em Membros Inferiores em mulheres grávidas

Association between Lingual Varicosity and Lower Limb Varicosity in pregnant women

Ana Flávia de Jesus Alves ¹
Camila Matarazzo ²
Gabriela Teixeira Gonçalves ³
Maria Bethânia Ramos Calsavara ⁴
Dra. Suzely Adas Saliba Moimaz ⁵
Dr. Orlando Adas Saliba Júnior ⁶

RESUMO

Há uma relação significativa entre varizes de perna e varizes sublinguais em gestantes, é provável que aquelas que tenham varizes das pernas tenham varicosidades linguais, mas o inverso não é necessariamente verdadeiro. Assim, este trabalho tem como objetivo verificar se há associação entre varicosidade lingual e varicosidade em membros inferiores em mulheres grávidas, a fim de buscar medidas preventivas e tratamento eficazes. Como metodologia, utilizou-se do estudo observacional, prospectivo, transversal, descritivo e analítico, a ser realizado por meio de exames bucais e exame dos membros inferiores de mulheres grávidas. A amostra será composta por 182 gestantes que demandarem serviços nas unidades de saúde de Araçatuba, SP, Brasil. Terá como critérios de inclusão mulheres grávidas que assinarem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e de exclusão lesões em membros inferiores; qualquer doença degenerativa conhecida em andamento; gestantes com classificação CEAP 4, 5 ou 6; cirurgia prévia de varizes; gestantes impossibilitadas de abrir a boca; gestantes com câncer na região de cabeça e pescoço. A equipe de trabalho será formada por dois examinadores (cirurgião-dentista e médico) e por quatro anotadores (voluntário).

Palavras-chave: Dilatação de vaso; Gestantes; Saúde pública.

¹ Acadêmica do Curso de Medicina

² Acadêmica do Curso de Medicina

³ Acadêmica do Curso de Medicina

⁴ Acadêmica do Curso de Odontologia - UNESP

⁵ Dra. em Odontologia Preventiva e Social - Docente de Odontologia na UNESP

⁶ Docente no Curso de Medicina - Dr. em Bases Gerais da Cirurgia - osalibajr@gmail.com

Avaliando os benefícios da Musicoterapia em recém-nascidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

Evaluating the benefits of Music Therapy in newborns in the Neonatal Intensive Care Unit

Ana Flávia de Jesus Alves ¹
Cíntia Kawata ²
Giulia Caroline Piperno ³
Kayene Alcântara Leivas ⁴
Laís Zanchetta Ramos ⁵
Beatriz Carmona Molinari ⁶

RESUMO

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal apresenta diversos fatores estressantes para os pacientes dela, incluindo a poluição sonora. Visto isso, a musicoterapia para recém-nascidos pré-termos hospitalizados é uma estratégia para mitigar o efeito deletério de sons nesse ambiente. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar os benefícios no bem-estar do recém-nascido pré-termo a partir da frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio e da escala de dor *Neonatal Facial Coding System*. Como metodologia, durante o período de março a agosto de 2022, cada recém-nascido pré-termo hospitalizado foi submetido a uma sessão única de musicoterapia de 20 minutos. A sessão de musicoterapia utilizou música não clássica instrumental em pacientes que estivessem de acordo com os critérios de inclusão (idade gestacional entre 27 e 37 semanas e sem intervenções durante 20 minutos prévios à sessão), sendo comparado seus valores antes e depois. Como resultados, foram incluídos 17 pacientes com idade gestacional entre 27 e 36 semanas. Dentre os parâmetros analisados, a frequência cardíaca apresentou diminuição significativa ($p=0,012$) quando comparada aos demais. Pode-se concluir que, diante de novas propostas que auxiliem o bem-estar do paciente hospitalizado, a musicoterapia tem importante benefício para essa mudança e demonstra que sua implantação pode ser realizada e incentivada.

Palavras-chaves: Terapias Complementares; Musicoterapia; Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

¹ Acadêmica do Curso de Medicina

² Acadêmica do Curso de Medicina

³ Acadêmica do Curso de Medicina

⁴ Acadêmica do Curso de Medicina

⁵ Acadêmica do Curso de Medicina

⁶ Docente no Curso de Medicina – Orientadora - bia_molinari@hotmail.com

Implementação de uma plataforma digital para registro e validação de procedimentos realizados por Médicos Residentes

Implementation of a digital platform for recording and validating procedures performed by Resident Doctors

Laira Rodrigues Martini ¹
Lucca Belluzzo Pozzetti ²
Maitê Gil Osaki ³
Marcela Almeida e Cardoso ⁴
Vitor Luan Costa Bastos ⁵
Dr. Rafael Saad ⁶

RESUMO

Na educação médica baseada em evidências, há a necessidade de instrumentos que auxiliem no desenvolvimento de competências e habilidades. O portfólio eletrônico possibilita um aprendizado organizado, ampliando a capacidade de autoavaliação do aluno. O registro de procedimentos realizados por médicos residentes em uma plataforma digital pode permitir uma melhor avaliação das competências profissionais adquiridas e uniformizar a formação entre os diferentes médicos residentes de um determinado programa de residência médica. Assim, o objetivo deste trabalho é o de avaliar a viabilidade do desenvolvimento e implementação de uma plataforma digital para registro de procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados por médicos residentes, o grau de satisfação dos usuários, suas vantagens e desvantagens. Utilizou-se como metodologia, a coleta de dados será realizada pela inserção dos procedimentos executados por 12 médicos residentes de um programa de Clínica Médica na plataforma digital, com acompanhamento e validação por médicos preceptores. A plataforma disponibilizará os principais procedimentos realizados na especialidade, a modalidade de supervisão, lista com o nome dos responsáveis e o grau de confiança para sua execução. Serão ainda utilizados formulários preenchidos pelos médicos residentes e preceptores para avaliar grau de satisfação e vantagens e desvantagens da plataforma digital em comparação ao registro em papel dos procedimentos.

Palavras-chave: Aplicativos móveis; Educação médica; Residência médica.

¹ Acadêmica do Curso de Medicina

² Acadêmico do Curso de Medicina

³ Acadêmica do Curso de Medicina

⁴ Acadêmica do Curso de Medicina

⁵ Acadêmico do Curso de Medicina

⁶ Docente no Curso de Medicina – Orientador - rafaelsaad89@gmail.com

Revisão Sistemática: Trombose Venosa Profunda de Membros Inferiores em pacientes com COVID-19

Systematic Review: Deep Venous Thrombosis of the Lower Limbs in patients with COVID-19

Ana Flávia de Jesus Alves ¹
Camila Matarazzo ²
Gabriela Teixeira Gonçalves ³
Prof. Dr. Orlando Adas Saliba Júnior ⁴

RESUMO

A pandemia da COVID-19 apresentou, no seu início, muitos casos moderados, graves e óbitos. Com o avanço do conhecimento, foi comprovada sua característica multissistêmica. Nesta perspectiva, alterações na hemostasia e na natureza pró-coagulante associada a fatores de riscos inerentes à imobilidade predisuseram a complicações trombóticas. Desta forma, este trabalho teve como objetivo analisar a prevalência de trombose venosa profunda (TVP) em membros inferiores em pacientes acometidos pelo coronavírus. Como metodologia, utilizou-se da pesquisa de revisão sistemática. Os procedimentos utilizados foram: identificação das palavras-chave, consulta em bases de dados e exclusão dos artigos em duplicata e outros. Como resultados, vinte e nove estudos foram incluídos, que foram conduzidos na China, nos EUA, na Itália, no Brasil, na França, na Suíça, na Espanha e na Hungria. Observou-se grande variabilidade na prevalência de TVP em pacientes com COVID-19, atingindo valores de 13,3% até 85,4%. Sugere-se que a ocorrência da mesma está associada com a gravidade desta doença. O método diagnóstico utilizado é o ultrassom Doppler. Os tratamentos frequentemente empregados para o manejo sugerem que a administração precoce de anticoagulante profilático beneficia o prognóstico e reduz as taxas de eventos tromboembólicos. Assim, pode-se concluir que a prevalência de TVP em membros inferiores de pacientes com COVID-19 apresenta variabilidade, sendo maior em casos mais graves da doença.

Palavras-chaves: Anticoagulante; SARS-Cov-2; Tromboembolia.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina

² Acadêmico do Curso de Medicina

³ Acadêmico do Curso de Medicina

⁴ Dr. em Bases Gerais da Cirurgia - Docente no Curso de Medicina - Orientador - osalibajr@gmail.com

Perfil Epidemiológico da Violência no Noroeste Paulista

Epidemiological Profile of Violence in the Northwest of São Paulo

Gabriella Andrade Lescano ¹
Larissa Maria Pagani Pires ²
Laura Alice Inoue Aguiar ³
Luana Freitas Freire ⁴
Yasmin Thiemy Livramento Rocha ⁵
Acadêmico do Curso de Medicina – UniSALESIANO Araçatuba
Profa. Lucila Bistaffa de Paula ⁶

RESUMO

A violência é um problema de saúde pública que se mantém presente na história da humanidade desde a antiguidade. Ela representa mais um dos diversos problemas sociais que acarretam altos custos para o Estado, além dos prejuízos físicos, psicológicos e emocionais de intensidade variável e individualizada. Por possuir dados escassos na literatura, o tema é pouco debatido dentro do contexto da saúde pública. Desta forma, faz-se importante traçar o perfil epidemiológico da violência tanto para a elaboração de novas políticas públicas como também aprimorar as já existentes. Tem-se como objetivo, desta forma, caracterizar o perfil epidemiológico acerca da violência em uma região do noroeste paulista no período de 2011 a 2021. Este estudo trata-se de um estudo epidemiológico observacional, transversal, documental, aplicado, explicativo, com abordagem quantitativa analítica dos 11166 casos registrados de violência no banco de dados do DATA SUS referentes ao Departamento Regional de Saúde II no período de 2011 a 2021. A base de critérios utilizados pertence à Ficha de Notificação Individual do Sistema de Informações de Agravos de Notificações, SINAN – Ministério de Saúde.

Palavras-chave: Saúde Pública; Vigilância Epidemiológica; Violência e Saúde.

¹ Discente do Curso Medicina

² Discente do Curso Medicina

³ Discente do Curso Medicina

⁴ Discente do Curso Medicina

⁵ Discente do Curso Medicina

⁶ Docente no Curso de Medicina – Orientadora – lucilapaula_med@unisalesiano.com

Análise acerca do perfil epidemiológico em relação ao diagnóstico de Câncer de Próstata em cidades do Noroeste Paulista

Analysis of the epidemiological profile in relation to the diagnosis of Prostate Cancer in cities in the Northwest of São Paulo

João Pedro Sangali Leite ¹
Lucas Marins Benedeti ²
Matheus Peracini Xavier do Nascimento ³
Vinícius Vilas Boas de Sene ⁴
Prof. Esp. Ricardo Burato Dias ⁵
Prof. Esp. Vera Franco da Silva Bento ⁶

RESUMO

O câncer de próstata (CaP) é a segunda neoplasia mais incidente no sexo masculino no Brasil, configurando um alto índice de mortalidade nessa população (13,1%). Assim, este estudo tem por objetivo elucidar o perfil epidemiológico do CaP em Araçatuba (SP) e comparar com o DRS II Araçatuba e o Estado de São Paulo. Como metodologia, utilizou-se de pesquisa de caráter descritivo, retrospectivo e documental, com abordagem quantitativa dos casos de CaP. Os dados obtidos através do banco de dados da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), de pacientes com diagnóstico de CaP entre 2006 e 2016. Como resultado, o diagnóstico apontou que a maioria ocorreu após os 60 anos. A taxa de escolaridade (anos de estudo), observado tendência inversamente proporcional a idade dos pacientes. O tempo médio entre o diagnóstico e início do tratamento em 70% dos pacientes não se enquadraram na “lei dos 60 dias”. Em relação às recidivas, observada maior taxa no Estado de São Paulo (10%), comparada ao DRS II Araçatuba (7%) e Araçatuba (9%). Teve-se como conclusão, a importância do rastreamento, diagnóstico e tratamento precoce é fundamental para evitar o desenvolvimento de sintomas mais graves da doença. Por fim, essenciais ações de educação em saúde à população e permanente para aos profissionais que atuam nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Câncer de próstata; Doença crônica; Epidemiologia.

¹ Acadêmico do Curso de Medicina

² Acadêmico do Curso de Medicina

³ Acadêmico do Curso de Medicina

⁴ Acadêmico do Curso de Medicina

⁵ Docente no Curso de Medicina – Orientador - rburatodias@gmail.com

⁶ Docente no Curso de Medicina – Coorientadora - verafranco1@yahoo.com.br

Normas para publicação
REVISTA eUnisalessianoS@úde

Terá como padrão as normas fundamentadas de Vancouver e, para casos específicos, ABNT.

1) Postagem e endereço eletrônico

Os originais devem ser encaminhados com uma cópia impressa a **eUnisalesianoS@úde**, Rodovia Senador Teotônio Vilela, Km 8,5 – Jardim Alvorada – Araçatuba / SP - CEP.: 16016-500, e outra ao endereço eletrônico **herculesfc@gmail.com / esaude@unisalesiano.com.br**

2) Formatação

O artigo deve ser digitado nos utilizando-se dos processadores Microsoft Office Word ou similar, apresentado em formato A4, fonte Cambria, tamanho da fonte 12, com margens superior e inferior de 2,5 cm, direita e esquerda de 3 cm. O espaçamento deve ser de 1,5, utilizando-se um só lado da folha. Utilizar, ainda, espaço correspondente de 1,5 cm a partir da margem para início dos parágrafos.

Os artigos devem ter um mínimo de 8 páginas e máximo de 20.

Devem anteceder o texto os seguintes itens:

Título do trabalho (Fonte Cambria, tamanho da fonte 20, em negrito, com espaçamento simples, centralizado, maiúsculo somente para a primeira letra. As demais primeiras, somente maiúsculas quando forem nomes próprios.

Exemplo:

Quantificação de partos naturais e cesarianas no Hospital Municipal da Mulher Araçatuba - S.P.

Uma linha depois do título principal do artigo deve estar: o mesmo título, porém, traduzido em inglês (Fonte Cambria, tamanho da fonte 12, em itálico, sem negrito, espaçamento simples e centralizado.

Exemplo:

*Quantification of Natural Births and Cesarean Section Performed
at the Hospital Municipal da Mulher – Araçatuba – S.P.*

Uma linha após o título em Inglês devem conter (justificado a direita, negrito, espaçamento simples, fonte 9), o nome do autor(es). Em nota de rodapé, a descrição do vínculo institucional do(s) autor(es). Indicar, ainda, em nota de rodapé, a Instituição, atividade ou cargo exercido e endereço eletrônico.

Renata Gava Rodrigues¹

Shedânie Carol Marques Rodrigues²

Carla Komatsu Machado³

¹ Acadêmica do 10.º termo do curso de Fisioterapia no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Araçatuba

² Acadêmica do 10.º termo do curso de Fisioterapia no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Araçatuba

³ Fisioterapeuta, Mestre em Fisiologia Geral e do Sistema Estomatognático pela Universidade de Campinas – UNICAMP, Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Araçatuba

Em seguida, deve estar o resumo com no máximo 120 palavras, (Fonte Cambria, tamanho da fonte 11, espaço entre linhas simples, sendo o título- RESUMO- em maiúsculo e negrito), que deve ocorrer respeitando um corpo com único parágrafo. Após o resumo, sem espaço, são apresentadas as palavras chave (até 5 palavras, fonte Cambria, tamanho da fonte 11, em negrito), em português e em ordem alfabética.

Exemplo:

RESUMO

Este trabalho verificou os índices quantitativos de partos normais e cesarianas no Município de Araçatuba/SP, entre os anos de 2000 e 2007, adotando como unidade de pesquisa o Hospital Municipal da Mulher *Dr. José Luis de Jesus Rosseto*. Foram analisados relatórios anuais e mensais fornecidos pela instituição e, com base nesses dados, verificou-se a diferença numérica entre tipos de partos, considerando-se que se trata de um órgão municipal, comparando-se os resultados obtidos com aqueles citados em estudos já realizados no Brasil, onde concluiu-se que houve aumento no número de partos cesarianas. Neste trabalho, é notado que por não se tratar de um hospital particular, os índices de partos naturais são maiores que os de cesarianas, e que, ainda assim, o número de partos cesarianas aumentou significativamente entre os anos de 2004 e 2007, aproximando-se muito da quantidade de partos naturais. As causas não são analisadas, porém este aumento pode estar relacionado com o aumento do número de complicações durante a gestação.

Palavras-Chave: Cesariana, Gestante, Hospital, Partos Normais

Posteriormente, abstract (versão inglês do resumo, fonte Cambria, tamanho da fonte 12, sendo a escrita ABSTRACT em maiúsculo e negrito, respeitando um único parágrafo, como no resumo em português) e Keywords (versão em inglês das palavras chaves, fonte Cambria, tamanho da fonte 11, negrito como no exemplo em português e em ordem alfabética).

Exemplo:

ABSTRACT

This project analyzed the numbers of natural births and cesarean sections done in the city of Aracatuba, between 2000-2007, using as a base the Hospital Municipal da Mulher “Dr. José Luis de Jesus Rosseto”. We analyzed the annual and mensal data given to us by the institution. We then verified the numerical difference between the two types of birth, considering the institution as part of the city government, comparing the results with national wide research, the increase of cesarean sections. Because the hospital is not private, the number of natural births are greater than cesarean sections, but an increase in the number of cesarean sections between 2004-2007 is relevant, almost to the point of being the same as the number of natural births. The cause of this effect could be related with the increase of the need for cesarean sections.

Key words: Cesarean sections, Natural birth, pregnancy, hospital

A estrutura do texto deve ser dividida em partes não numeradas e com subtítulos. Os subtítulos devem ser destacados no texto com um espaço posterior ao término do texto anterior, alinhado à esquerda (Fonte Cambria, tamanho da fonte 12, e negrito), sendo a primeira letra maiúscula, as demais somente serão maiúscula caso seja nome próprio, porém, não há espaço que o separe do próximo texto, a qual faz menção. É essencial conter introdução, o corpo do texto, conclusão ou considerações finais e referência bibliográfica.

3) Referência no corpo de texto

Quando usa-se citação livre sem transcrever as palavras do autor, a bibliografia deve ser indicada no texto pelo sobrenome do(s) autor(es), em maiúscula, e ano de publicação (SILVA, 1995) de acordo com **ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso um mesmo autor citado tiver mais de uma publicação no mesmo ano, identificar cada uma delas por letras (SILVA, 1995a). Fonte Cambria, tamanho da fonte 12.

Na norma da **Vancouver**, esse procedimento comparece no texto como exemplo abaixo, ordem numérica sequencial.

Exemplo:

A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto.

Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a maiores morbidade e mortalidade materna e infantil [1]. Em publicação de 2001, a “cesariana a pedido” tem sido implicada como uma das causas do crescente aumento de partos cesarianas [2].

Na norma da **ABNT**:

A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto.

Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a maiores morbidade e mortalidade materna e infantil (RATINER, 1996). Em publicação de 2001, a “cesariana a pedido” tem sido implicada como uma das causas do crescente aumento de partos cesarianas (CURY & MENEZES, 2006).

No caso de envolver citação sem recuo, justamente por ser inferior a 3 linhas acrescenta-se o sobrenome do(s) autor(es), em maiúscula, ano e página (RATINER, 1995, p.12). Neste caso, usar fonte Cambria, tamanho 12 e itálico.

Exemplo:

[...] Cesárias são intervenções cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto. [...] (RATINER, 1996, p.12)

4) Citações Textuais

Para as citações textuais longas - transcrição literal de textos de outros autores (mais de 3 linhas), deve-se constituir parágrafo independente, com recuo de 4 cm, itálico, tamanho da fonte 11. O espaçamento entre linhas passa a ser simples, no entanto, a fonte permanece a mesma.

Para as normas da **Vancouver**:

A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto. Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a maiores morbidade e mortalidade materna e infantil [2].

Para as normas da **ABNT**:

A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto. Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a maiores morbidade e mortalidade materna e infantil (RATTNER, 1996, p.2).

5) Referências Bibliográficas

Nas Referências Bibliográficas devem constar somente aquelas citadas no texto. Estas Referências deverão estar em ordem alfabética, dentro das normas usuais da **ABNT**, e **Vancouver** na ordem sequencial numérica, conforme aparecem no texto.

Para aqueles que recorrerem à norma da **Vancouver**:

1. CURY AF, MENEZES PR. Fatores associados à preferência por cesariana. *Rev. Saúde Pública*. 2006 Abr 40(2):226-32 [1] [SEP]
2. RATTNER D. Sobre a hipótese de estabilização das taxas de cesárea do Estado de São Paulo. *Rev. Saúde Pública*. 1996 Fev 30(1).

Para aqueles que recorrerem a norma da **ABNT**:

HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

CURY AF, MENEZES PR. Fatores associados à preferência por cesariana. **Revista Saúde Pública**. 40(2):226-32, Abr. 1996

RATTNER D. Sobre a hipótese de estabilização das taxas de cesárea do Estado de São Paulo. **Revista Saúde Pública**. 30(1). Fev. 1996

6) Nomenclaturas

Para o uso da nomenclatura tabelas, ilustrações, gráficos, a mesma deve estar grafados em negrito, com fonte Cambria, tamanho 11 e alinhada à esquerda.

Devem ser numeradas em arábico, consecutivamente, obedecendo a ordem que aparece no texto. Não usar abreviaturas (como no caso de Fig.).

Exemplo:

Tabela 1 – Dados das quantidades de partos normais e cesarianas nos anos de 2000 e 2003

Parâmetro	Condição			
	SEx.	Ex.12/12	Ex.24/24	Ex.48/48
Ht	33,81±1,5	31,08±3,6	35,96±1,1	33,70±2,4
Hb	7,16±0,2 ^B	8,44±0,4 ^{AB}	8,83±0,2 ^A	8,23±0,2 ^{AB}

Fonte: Martins - 2006

No interior da tabela, os dados devem ser digitados em fonte Cambria, tamanho da fonte 9. As tabelas não devem ter suas bordas fechadas a direita e esquerda, mas conter bordas superior e inferior, com suas respectivas divisões internas.

Com relação a autoria dos dados, a fonte deve ser Cambria, tamanho da fonte 10.

7) Artigos com fotos, dados de seres humanos ou animais

No caso de haver **fotos de pessoas**, os autores deverão providenciar documento de autorização, bem como respeitar a regra de desfocar a imagem – impossibilitando a identificação – do rosto quando se tratar de menores de 18 anos. (art. 5º, inciso X, da constituição federal de 1988).

Os autores de artigos cuja metodologia envolveu a participação e coleta de dados de seres humanos de forma direta ou indireta, assim como uso de animais, devem enviar uma cópia do certificado de autorização para a realização da pesquisa emitido pelo **CEP** (Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos) ou pelo **CEUA** (Comissão de Ética e Pesquisa no uso de Animais).

Sem esta certificação os trabalhos não serão avaliados ou publicados.

8) Restrições

É vedada qualquer publicação realizada na **eUnisalessianoS@úde** em outras revistas científicas.

Nesta Edição Especial, a eUnisalesianoS@úde traz os Anais da Conferência de Medicina do UniSALESIANO, de Araçatuba-SP, já em sua 5ª edição, integrando o calendário oficial desta Universidade desde o ano de 2022. O evento busca, através do ensino, pesquisa e extensão, estimular a iniciação dos alunos no meio acadêmico; promover, através da divulgação de trabalhos, a troca de experiências tanto entre os alunos quanto entre estes e seus professores; e assegurar o reconhecimento institucional destas ações.

Nestes compilados, organizados, apresentamos com grata satisfação a primeira edição dos Anais da 5ª Conferência de Medicina do UniSALESIANO, coordenada com esmero pelo Dr. Antônio Henrique Oliveira Poletto, contendo 26 resumos provenientes de distintas áreas do saber no âmbito das ciências da vida e da saúde.

